

HOA XÁC PHÁO - SALVIA

Thời gian nảy mầm :	5-7 ngày
Thời gian bắt đầu sang chậu, luống :	25-30 ngày
Thời gian bắt đầu ra hoa :	60-70 ngày
Chiều cao cây :	30-35 cm
Kích cỡ hoa :	10-15 cm

NÂY MẦM Giai đoạn 0

Độ pH đất trồng: 5.8 – 6.2

NÂY MẦM Giai đoạn 1

Rễ mầm mọc trong vòng 4 – 5 ngày.

Hình ảnh: Vào cuối Giai đoạn 1, rễ mầm sẽ mọc lên và bắt đầu hình thành rễ.

Độ ẩm: Hoa xác pháo cần hút nhiều nước. Duy trì lượng nước trung bình, nhưng không đẫm ướt. Phủ hạt giống bằng một lớp đất trồng mỏng để duy trì độ ẩm.

Nhiệt độ đất: 22⁰ – 24⁰C .

Ánh sáng: Ánh sáng cần cho hạt nảy mầm. Cung cấp 100 – 1000 lux trong khu vực nảy mầm.

Ec : 0.5 – 0.75

NÂY MẦM Giai đoạn 2

Để cây non phát triển tốt nhất, xử lý độ ẩm trong 7 ngày nảy mầm đầu tiên của hoa xác pháo.

Hình ảnh: Vào cuối Giai đoạn 2, việc nảy mầm hoàn tất. Rễ phát triển, thân hoa mọc lên và lá mầm nở rộng.

Độ ẩm: Đất trồng ẩm có thể sờ thấy được nhưng không ướt sũng. Đất sũng nước sẽ làm giảm số lượng cây non sẽ sang luống.

Nhiệt độ đất: Sau khi lá mầm mọc, giảm nhiệt độ đến 20⁰ – 21⁰C .

Phân bón: Không cần thiết trong giai đoạn này.

Ec : 0.5 – 0.75

NÂY MẦM Giai đoạn 3

Hoa xác pháo nhạy cảm với lượng muối cao và có thể coi như thước đo độ EC của vụ mùa.

Hình ảnh: Vào cuối Giai đoạn 3, rễ đã đâm sâu vào túi cây con và cây mọc những chiếc lá đầu tiên.

Độ ẩm: Duy trì độ ẩm trung bình trong túi cây con. Nhiều nước quá, hoa sẽ bị nở sớm.

Nhiệt độ đất: 18⁰ – 20⁰C .

Phân bón: Bón cây con với liều lượng hạn chế theo công thức như sau để pha cho 100l nước và tưới từ 3-4 ngày 1 lần cho cây.

Nitrat Canxi	15-0-0	35 gram
Nitrat Kali	13-0-46	04 gram

Chú ý : Lá hơi xám hay nâu do quá nhiễm amonium gây độc .Tĩnh mạch lá trưởng thành bị vàng do thiếu magiê.

Ec : 0.75 – 1.0.

NÂY MÂM Giai đoạn 4

Lá bị quăn lại, cụp xuống do đất trồng quá khô; độ EC quá cao hay nhiệt độ quá lạnh.

Hình ảnh: Vào cuối Giai đoạn 4, rẽ giữ cây con thành khối dễ dàng . Cành non mọc 2 – 3 lá thật.

Độ ẩm: Giống Giai đoạn 3.

Nhiệt độ đất: 18⁰ – 20⁰C để cây con vững chắc và không bị dài ra.

Phân bón: Giống Giai đoạn 3.(nếu cần,có thể tăng thêm lượng Nitrat canxi và Nitrat kali)

Ec : 0.75 – 1.0

GIAI ĐOAN PHÁT TRIỂN

Đất trồng: Cung cấp hệ thống thoát nước và thông khí tốt.

Độ pH đất trồng: 5.8 và 6.2.

Độ ẩm: Để đất trồng hơi khô giữa những lần tưới. Không để cây bị héo.

Phân bón: Bón thường xuyên với liều lượng như sau:

Nitran Canxi 15-0-0 47 gram

Nitrat Kali 13-0-46 21 gram

Photphat Kali Đơn 0-52-34 24 gram

Chú ý : Sự kết hợp giữa lượng phân bón ít và nhiệt độ thấp sẽ làm vàng lá cây. Hoa xác pháo rất nhạy cảm với lượng muối cao (Ec cao) và phải điều chỉnh để lá không bị hư.

Ec : 0.75 – 1.0

Nhiệt độ: 21 – 24⁰C vào ban ngày và 13 – 16⁰C vào ban đêm.

Ánh sáng: Hoa Xác Pháo cần ánh sáng trung bình. Trong điều kiện ánh sáng thấp, ánh sáng bổ sung sẽ làm giảm sự phát triển thân cây .

Chất kích thích tăng trưởng:

Hoa xác pháo thích hợp với các chất điều hoà tăng trưởng như Bonzi.B – nine

Côn trùng: Bọ Trĩ,các loài rệp , muỗi trắng và những con nhện nhỏ .

Bệnh dịch: Đốm lá , Phấn trắng .