



Hướng dẫn kĩ thuật

Vạn Thọ Mỹ F_1 – MS FMAR031: IVORY

Thời gian cây con: 3-4 tuần

Ra hoa từ ngày sang chậu: 8 – 9 tuần

- Dòng vạn thọ Mỹ lùn tối ưu cho việc trang trí cảnh quan, trồng trang trí trong các chậu to.
- Hoa to và chắc, cùng với khả năng kháng bệnh tốt khi trồng ngoài trời.

Thông tin chung

Ánh nắng	Điều kiện gieo trồng	Chiều cao cây	Tán cây	Kích cỡ bông
Nắng nhiều	Quanh năm	40 – 45 cm	20 – 25 cm	7 – 8 cm

Nảy mầm

Dạng hạt	Kích cỡ khay gieo (số lỗ)	Số hạt/lỗ	Thời gian cây con (tuần)	Ngày nảy mầm	Số đo pH/EC	Phủ hạt
Hạt đã được làm sạch / nhuộm	209	1	3 – 4	5 – 7	6.2 – 6.5 pH 0.75 mmhos/cm	Có

Giai đoạn cây con

	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Giai đoạn 3	Giai đoạn 4
Độ ẩm giá thể	Ướt	Ẩm-ướt	Ẩm-ướt	Ẩm-Khô
Nhiệt độ	20 – 22°C	20 – 22°C	18 – 20°C	18 – 20°C
Ánh sáng	<1,500 f.c.	<1,500 f.c.	<3,000 f.c.	<5,000 f.c.
Phân bón			0.1 – 0.15g đạm/lít nước <1.5 EC	0.1 – 0.15g đạm/lít nước < 1.5 EC

Những lưu ý trong giai đoạn cây con

Duy trì pH đất ở mức 6.2 – 6.5 để tránh bị ngộ độc sắt. Phủ hạt bằng 1 lớp vermi mỏng.

Ở giai đoạn 3, dùng phân bón gốc Ni-trát tỉ lệ 0.1-0.15g đạm/lít nước từ 15-5-15, 17-5-17 hoặc 13-2-13.

Ở giai đoạn 4, dùng phân tỉ lệ 0.1-0.15g đạm/lít nước từ 13-2-13 để giúp cây con săn chắc.

Giai đoạn trồng

Nhiệt độ gieo trồng	pH/EC	Phân bón	Thời gian chiếu sáng
(ngày) 18 – 20°C (đêm) 16 – 18°C	6.0 – 6.5 pH < 1.5 mmhos/cm	0.15 – 0.19g đạm/lít nước 1.25 – 1.75 EC	Ngày ngắn (3,000 – 5,000 f.c.)

Lưu ý trong giai đoạn trồng

Dòng WhiteGold Max khá nhạy cảm với nhiệt độ thấp và đốm đỏ có thể xuất hiện trên tán lá nếu nhiệt độ trung bình xuống dưới 15°C trong nhiều ngày liên tiếp. Màu lá sẽ trở về bình thường sau khi nhiệt độ ấm trở lại.

Thời gian ra hoa từ ngày sang chậu

Kích cỡ chậu	Số cây/chậu	Thời gian ra hoa	Mùa vụ	Chất điều hòa sinh trưởng
10 cm	1	7 – 8 (tuần)	Mùa xuân	-
15 – 16 cm	1	8 – 9 (tuần)	Mùa hè	-

Những lưu ý khi bón phân

Về phân bón, tưới từ 1 đến 2 lần mỗi tuần phân bón gốc Nitrat tỉ lệ 0.15-0.19g đậm/lít nước từ 15-0-15, thỉnh thoảng có thể đổi sang 20-10-20 nhưng lưu ý không hạ pH xuống quá mức cho phép (6.0 – 6.5). Duy trì EC đất ở mức 1.25 – 1.75 mS/cm. Duy trì EC đất và pH như trên.

Những lưu ý khi trồng

Duy trì pH đất ở mức 6.2 – 6.5 để tránh bị ngộ độc sắt. Không cần sử dụng chất điều hòa sinh trưởng khi trồng dưới điều kiện ngày ngắn, vì cây sẽ thấp tự nhiên. Nếu trồng ở điều kiện ngày dài thì nên sử dụng chất điều hòa sinh trưởng. Phun daminozide nồng độ 5,000 ppm lên tán lá 2 lần trong quá trình trồng sẽ giúp kiểm soát sự phát triển của cây.

Các vấn đề thường gặp

Côn trùng: bọ hút chích khi mới trồng; bọ trĩ và mối trong quá trình ra hoa

Ghi chú

Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.

Hình ảnh

