



HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Ngọc thảo F1: APEX

Thời gian cây con: 4-6 tuần

Ra hoa từ ngày sang chấu: 7-9 tuần

- Dòng sản phẩm đa dạng về màu sắc, cây khỏe, thời gian ra hoa không chênh lệch nhiều giữa các màu.
- Là dòng sản phẩm tiêu chuẩn về mặt kinh tế, tốc độ phát triển, độ sai hoa của khi nói về Ngọc Thảo từ hạt.
- Là sự thay thế tuyệt vời cho Mai Địa Thảo bị bệnh mốc sương khi trồng cảnh quan.
- Đường kính to (5 cm)
- Cây có độ đồng đều cao và phân nhánh nhiều.

Thông tin chung

Ánh nắng	Mùa vụ	Chiều cao cây	Tán cây
Nắng ít / Nắng nhiều	Xuân, cuối Xuân, Hạ	8-12 in. (20-30 cm)	10-12 in. (20-30 cm)

Nảy mầm

Dạng hạt	Khay gieo Kích cỡ (lỗ)	Số hạt/lỗ	Thời gian cây con (tuần)	Ngày nảy mầm	Số đo pH/EC mS/cm	Phủ hạt
Thô	112	1	4-6	8	5.8-6.2 pH 0.9-1.3 mS/cm	Lớp mỏng

Giai đoạn cây con

	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Giai đoạn 3	Giai đoạn 4
Độ ẩm giá thể	Ướt đầm	Ướt đầm	Ướt - Ẩm	Ướt - Ẩm
Nhiệt độ	70-75°F (22-24°C)	70-75°F (22-24°C)	70-74°F (21-23°C)	70-74°F (21-23°C)
Ánh sáng	Có	Có	2,500-4,000 f.c.	2,500-4,000 f.c.
Phân bón	-	-	0.07-0.12g đạm/lít nước; 0.9-1.3 EC	0.07-0.12g đạm/lít nước; 0.9-1.3 EC
Điều hòa sinh trưởng			Daminozide 1.5 – 3g /L	Daminozide 1.5 – 3g /L

Những lưu ý trong giai đoạn cây con

Ngọc Thảo Apex không phụ thuộc vào thời gian chiếu sáng. Chỉ sử dụng thuốc điều hòa sinh trưởng khi khu vực trồng có rất ít ánh sáng.

Ở giai đoạn 3,4 giá thể trồng nên được cho khô giữa các lần tưới.

Giai đoạn trồng

Sang chấu Nhiệt độ	Số đo pH/EC	Phân bón	Thời gian chiếu sáng
(ngày) 76-78°F (24-26°C) (đêm) 66-68°F (19-20°C)	5.8-6.2 0.9-1.3	0.07-0.124g đạm/lít nước; <0.7 EC	2,000-4,000 f.c.

Ra hoa từ ngày sang châu

Kích cỡ chậu	Số cây/chậu	Thời gian	Mùa vụ	Điều hòa sinh trưởng
10-13 cm	1	7-9 (tuần)	Mùa xuân	-
14-17 cm	1-3	7-10 (tuần)	Mùa xuân	-
25-30 cm	1-3	8-10 (tuần)	Mùa xuân	-

Những lưu ý khi trồng

Đảm bảo nhiệt độ không xuống dưới quá 16°C sau, cây sẽ bị chậm phát triển.

Giá thể trồng nên được cho khô giữa các lần tưới.

Ghi chú: Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.

Hình ảnh



Pink

Orange

Red Imp.

White

Violet

Sweet Orange

Lavender

Mix