



HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Ngọc thảo – MS: IMP402 – IMP407: Solarscape

Cây cho sai hoa, cây phát triển khỏe.

Màu sắc hoa rực rỡ dù trồng dưới nắng gắt, thích hợp trồng thảm và trong chậu.

Thời gian cây con: 5-6 tuần

Ra hoa từ ngày sang chậu: 7-10 tuần

- Dòng sản phẩm đa dạng về màu sắc, cây khỏe, thời gian ra hoa không chênh lệch nhiều giữa các màu.
- Dòng sản phẩm lai ngọc thảo đầu tiên từ hạt, cung cấp chất lượng tương đồng với cây giâm cành nhưng không phải lo lắng về phí bản quyền.
- Thích hợp trồng kết hợp các màu với nhau do tính chất tương đồng.

Thông tin chung

Ánh nắng	Bloom Season	Chiều cao cây	Tán cây	Khoảng cách
Nắng ít / Nắng nhiều	Xuân, cuối Xuân, Hạ, cuối Hạ	9-11 in. (23-28 cm)	15-20 in. (38-51 cm)	12-14 in. (30-36 cm)

Nảy mầm

Dạng hạt	Khay gieo Kích cỡ (lỗ)	Số hạt/lỗ	Thời gian cây con (tuần)	Ngày nảy mầm	Số đo pH/EC	Phủ hạt
Thô	112	1	5-6	4-5	5.8-6.2 pH 0.05-0.07 mmhos/cm	Lớp mỏng

Giai đoạn cây con

	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Giai đoạn 3	Giai đoạn 4
Độ ẩm giá thể	Uớt-uớt ẩm	ướt	Ẩm – Uớt	Hơi ẩm-uớt
Nhiệt độ	72-77°F (22-25°C)	72-77°F (22-25°C)	65-72°F (18-22°C)	65-72°F (18-22°C)
Ánh sáng	Có	450-700 f.c. (4,800-7,500 Lux)	450-700 f.c. (4,800-7,500 Lux)	450-700 f.c. (4,800-7,500 Lux)
Phân bón		<0.1g đạm/lít nước; <0.7 EC	<0.1g đạm/lít nước; <0.7 EC	<0.1g đạm/lít nước; <0.7 EC
Điều hòa sinh trưởng		Daminozide/ 2,5g - 5g/L	Daminozide/ 2,5g - 5g/L	

Những lưu ý trong giai đoạn cây con

Độ ẩm của giá thể rất quan trọng trong giai đoạn 1 và 2. Ánh sáng và độ ẩm không khí là điều kiện tiên quyết cho việc nảy mầm hiệu quả. Phủ 1 lớp mỏng đá vermi có thể giúp tăng độ ẩm xung quanh hạt. Tránh để nhiệt độ xuống dưới 17°C. Nhiệt độ từ 29°C trở lên có thể cản trở tốc độ nảy mầm và giảm tỉ lệ nảy mầm. Ở giai đoạn 3, lặp đi lặp lại việc phun chất điều hòa sinh trưởng Daminozide (2,5g – 5g/L) nếu có thể.

Giai đoạn trồng

Sang chậu Nhiệt độ	Số đo pH/EC	Phân bón	Thời gian chiếu sáng
(ngày) 68-75°F (20-24°C) (đêm) 60-68°F (16-20°C)	5.8-6.2 0.5-0.75	pH<0.1g đạm/lít nước; <0.7 EC	Không ảnh hưởng bởi thời gian chiếu sáng

Ra hoa từ ngày sang châu

Kích cỡ chậu	Số cây/chậu	Thời gian	Mùa vụ	Điều hòa sinh trưởng
Khay 6 lỗ	1	7-8 (tuần)	Mùa xuân	-
10-15 cm	1	8-9 (tuần)	Mùa xuân	-
20 cm	1-3	9-10 (tuần)	Mùa xuân	-

Những lưu ý khi trồng

Dòng Solarscape có nhu cầu phân bón từ ít đến vừa, vì vậy nên sử dụng NPK có tỉ lệ đạm Nitrat thấp (0.07 – 0.1 g đậm/L)

Ngọc thảo nhạy cảm với chất điều hòa sinh trưởng. Lưu ý không tưới đẫm.

Nhiệt độ khuyến cáo: tối thiểu 16°C, tối đa 29°C. Nhiệt độ trung bình trong ngày nếu giảm có thể khiến thời gian ra hoa bị kéo dài thêm từ 2 đến 4 ngày.

Ghi chú: Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.

Hình ảnh

