

# Hướng dẫn kĩ thuật

## Cúc Đài Loan – MS: FAST000 – FAST006: Bonita

Thời gian cây con: 4 – 5 tuần

Ra hoa từ ngày sang chậu: 10 – 11 tuần

### Thông tin chung

| Ánh nắng | Điều kiện gieo trồng | Chiều cao cây | Tán cây | Khoảng cách |
|----------|----------------------|---------------|---------|-------------|
| Nắng     | Xuân, Hè             | 50 – 60 cm    | -       | 10 – 12 cm  |

### Nảy mầm

| Dạng hạt | Kích cỡ khay gieo (số lỗ) | Số hạt/lỗ | Thời gian cây con (tuần) | Ngày nảy mầm | Số đo pH/EC                   | Phủ hạt |
|----------|---------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-------------------------------|---------|
| Hạt thô  | 209                       | 1         | 4 – 5                    | 5 – 7        | 5.8 – 6.2 pH<br>0.75 mmhos/cm | Có      |

### Giai đoạn cây con

|               | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2                   | Giai đoạn 3                              | Giai đoạn 4                              |
|---------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Độ ẩm giá thể | Ướt         | Ẩm – ướt                      | Ẩm – ướt                                 | Ẩm                                       |
| Nhiệt độ      | 21°C        | 16 – 21°C                     | 16 – 21°C                                | 16 – 21°C                                |
| Ánh sáng      |             | 1,000 – 2,500 f.c.            | 1,000 – 2,500 f.c.                       | 2,500 – 5,000 f.c.                       |
| Phân bón      |             | <0.1g đạm/lít nước<br><0.7 EC | 0.1 – 0.15g đạm/lít nước<br>0.7 – 1.2 EC | 0.1 – 0.15g đạm/lít nước<br>0.7 – 1.2 EC |

### Những lưu ý trong giai đoạn cây con

Tránh để đất quá ướt, sẽ làm giảm tỉ lệ nảy mầm.

Cúc Đài Loan nhạy cảm với sự thiếu hụt bo, vì vậy duy trì pH ở mức tối ưu (5.8 – 6.2) và nên phun thêm bo mỗi lần tưới nước.

Nên sử dụng phân bón gốc can-xi ni-trát, sẽ kích thích thân cây & rễ cây phát triển tốt hơn.

Cây nhạy cảm với điều kiện chiếu sáng & stress môi trường. Không được sang chậu trễ, sẽ khiến cây quá lùn dễ làm hoa cắt cành.

### Giai đoạn trồng

| Nhiệt độ gieo trồng       | pH/EC                              | Phân bón                                    | Thời gian chiếu sáng |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| (ngày) 21°C<br>(đêm) 15°C | 5.5 – 6.5 pH<br>0.7 – 0.8 mmhos/cm | 0.175 – 0.225g đạm/lít nước<br>1.2 – 1.5 EC | Bắt buộc ngày dài    |

### Thời gian ra hoa từ ngày sang chậu

| Loại cây | Mùa vụ | Mật độ gieo trồng          | Thời gian canh tác |
|----------|--------|----------------------------|--------------------|
| -        | Hè     | 11 – 22 cây/m <sup>2</sup> | 10 – 11 (tuần)     |

## Những lưu ý khi trồng

---

Dòng Bonita có khả năng kháng nấm Fusarium tốt, nhưng nhà vườn vẫn nên hấp đất & thay phiên canh tác để tránh lây lan bệnh.

Duy trì EC đất ở mức 0.7 – 0.8. EC <0.5 sẽ khiến cây bị vàng lá, trong khi EC >0.8 sẽ khiến tán lá phát triển quá sung, hoa nở chậm & thời gian nở hoa ngắn.

Cây sẽ bắt đầu đóng nụ dưới điều kiện ngày dài & nhiệt độ >16°C. Nhiệt độ ban đêm <16°C sẽ khiến cây phát triển sinh dưỡng quá nhiều & đồng thời nở hoa hình dáng bất thường.

## Ghi chú

---

Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.

## Hình ảnh

---

