

Hướng dẫn kĩ thuật

Cúc Đài Loan – MS: FAST030 – FAST037: Fan

Thời gian cây con: 3 – 4 tuần

Ra hoa từ ngày sang chậu: 9 – 11 tuần

Thông tin chung

Ánh nắng	Điều kiện gieo trồng	Chiều cao cây	Tán cây	Khoảng cách
Nắng	Xuân, Hè	55 – 60 cm	-	10 – 12 cm

Nảy mầm

Dạng hạt	Kích cỡ khay gieo (số lỗ)	Số hạt/lỗ	Thời gian cây con (tuần)	Ngày nảy mầm	Số đo pH/EC	Phủ hạt
Hạt thô	209	3 – 5	4 – 5	3 – 4	5.8 – 6.2 pH 0.75 mmhos/cm	Có

Giai đoạn cây con

	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Giai đoạn 3	Giai đoạn 4
Độ ẩm giá thể	Uớt	Ẩm – uớt	Ẩm – uớt	Ẩm
Nhiệt độ	20 – 21°C	16 – 21°C	16 – 21°C	16 – 21°C
Ánh sáng		1,000 – 2,500 f.c.	1,000 – 2,500 f.c.	2,500 – 5,000 f.c.
Phân bón		<0.1g đạm/lít nước <0.7 EC	0.1 – 0.15g đạm/lít nước 0.7 – 1.2 EC	0.1 – 0.15g đạm/lít nước 0.7 – 1.2 EC

Những lưu ý trong giai đoạn cây con

Tránh để đất quá ướt, sẽ làm giảm tỉ lệ nảy mầm.

Cúc Đài Loan nhạy cảm với sự thiếu hụt bo, vì vậy duy trì pH ở mức tối ưu (5.8 – 6.2) và nên phun thêm bo mỗi lần tưới nước.

Nên sử dụng phân bón gốc can-xi ni-trát, sẽ kích thích thân cây & rễ cây phát triển tốt hơn.

Cây nhạy cảm với điều kiện chiếu sáng & stress môi trường. Không được sang chậu trễ, sẽ khiến cây quá lùn dễ làm hoa cắt cành.

Giai đoạn trồng

Nhiệt độ gieo trồng	pH/EC	Phân bón	Thời gian chiếu sáng
(ngày) 16°C (đêm) 14°C	6.0 – 6.5 pH 0.7 – 0.8 mmhos/cm	0.175 – 0.225g đạm/lít nước 1.2 – 1.5 EC	Bắt buộc ngày dài

Thời gian ra hoa từ ngày sang chậu

Loại cây	Mùa vụ	Mật độ gieo trồng	Thời gian canh tác
-	Hè	11 – 22 cây/m ²	9 – 10 (tuần)

Những lưu ý khi trồng

Khi sang chậu, cần sử dụng đất nhiều dinh dưỡng. Không tái sử dụng đất đã dùng trồng cúc Đài Loan vào năm trước. Cây có khả năng kháng nấm Fusarium tốt & có thể trồng cách năm. Không được trồng 2 vụ cúc liên tiếp trên cùng 1 luống, sẽ phát sinh nấm bệnh.

Duy trì EC đất ở mức 0.7 – 0.8. EC <0.5 sẽ khiến cây bị vàng lá, trong khi EC >0.8 sẽ khiến tán lá phát triển quá sung, hoa nở chậm & thời gian nở hoa ngắn.

Cây sẽ bắt đầu đóng nụ dưới điều kiện ngày dài & nhiệt độ >14°C. Nhiệt độ thấp sẽ giúp cây phát triển tốt hơn nhưng sẽ trì hoãn thời gian ra hoa. Nhiệt độ ban đêm <8°C sẽ khiến thân cây bị ngắn & đồng thời nở hoa hình dáng bất thường.

Ghi chú

Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.

Hình ảnh

