

Hướng dẫn kĩ thuật

Hoa chuông cắt cành – MS: FCAM020 – FCAM024: Campana

Thời gian cây con: 7 – 8 tuần

Ra hoa từ ngày sang chậu: 10 – 14 tuần

Mật độ gieo trồng: 64 – 80 cây/m²

Thích hợp trồng trong: nhà kính

- Dòng hoa cắt cành chuyên nghiệp chất lượng cao
- Phát triển đồng đều
- Nở hoa ngọn 100%, nhánh cây khỏe và tán sung

Thông tin chung

Ánh nắng	Điều kiện gieo trồng	Chiều cao cây	Tán cây	Khoảng cách
Nắng	Quanh năm	76 – 86 cm	–	–

Nảy mầm

Dạng hạt	Kích cỡ khay gieo (số lỗ)	Số hạt/lỗ	Thời gian cây con (tuần)	Ngày nảy mầm	Số đo pH/EC	Phủ hạt
Hạt bọc	209	1	7 – 8	4 – 5	5.8 – 6.5 pH 0.75 mmhos/cm	Không

Giai đoạn cây con

	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Giai đoạn 3	Giai đoạn 4
Độ ẩm giá thể	Ướt	Ẩm – ướt	Ẩm – ướt	Ẩm – ướt
Nhiệt độ	20 – 22°C	20 – 22°C	16 – 18°C	16 – 18°C
Ánh sáng	Chiếu sáng	370 – 2,500 f.c. (4,000 – 26,900 Lux)	370 – 2,500 f.c. (4,000 – 26,900 Lux)	370 – 5,000 f.c. (4,000 – 53,800 Lux)
Phân bón	<0.1g đạm/lít nước <0.7 EC	<0.1g đạm/lít nước <0.7 EC	0.1 – 0.175g đạm/lít nước 0.7 – 1.2 EC	0.1 – 0.175g đạm/lít nước 0.7 – 1.2 EC

Những lưu ý trong giai đoạn cây con

Cây ngày dài. Để thân cây phát triển tốt, cung cấp điều kiện ngày ngắn (<11 tiếng) trong giai đoạn cây con từ 1.5 đến 2 tuần sau khi gieo. Sau khi sang chậu, cung cấp điều kiện ngày dài (>14 tiếng) từ 4 đến 5 tuần sau khi sang chậu. Duy trì độ ẩm trung bình. Để cây đủ cao, đất trồng yêu cầu đủ phân bón & độ ẩm. Điều kiện sinh trưởng khô khan sẽ khiến cây ra hoa sớm & bị thấp. Tuy nhiên, tưới nước quá nhiều sẽ khiến thân và rễ bị suy yếu dẫn đến cây bị gãy.

Giai đoạn trồng

Nhiệt độ gieo trồng	pH/EC	Phân bón	Thời gian chiếu sáng
(ngày) 16 – 21°C (đêm) 12 – 15°C	5.5 – 6.0 pH 0.7 – 1.0 mmhos/cm	0.175 – 0.225g đạm/lít nước 1.2 – 1.5 EC	Bắt buộc ngày dài

Những lưu ý trong giai đoạn cây con

Cây yêu cầu thời gian chiếu sáng >14 tiếng/ngày để kích thích quá trình nở hoa.

Thời gian ra hoa từ ngày sang chậu

Loại cây	Mùa vụ	Mật độ gieo trồng	Thời gian canh tác
-	-	65 – 86 cây/m ²	10 – 14 (tuần)

Những lưu ý khi bón phân

Dòng Campana yêu cầu đầy đủ chất dinh dưỡng để đạt chiều cao tối ưu. Bón phân bón tiêu chuẩn hòa lẫn với nguyên tố vi lượng, hàm lượng đạm từ 0.175 đến 0.225g/L (1.2 đến 1.5 EC). Bón phân liên tục hòa lẫn với nước tưới trong vòng 4 tuần đầu tiên kể từ ngày sang chậu. Sau đó, giảm lượng phân bón xuống còn 0.145 đến 0.175 g đạm/L nước (1.0 – 1.2 EC).

Những lưu ý khi trồng

Không sử dụng chất điều hòa sinh trưởng.

Các vấn đề thường gặp

Côn trùng: rệp vừng, bọ trĩ, sâu đục lá

Bệnh: nấm Fusarium, nấm Rhizoctonia, đốm lá (nấm Downey Mildew và nấm Ramularia), bệnh rỉ sắt

Ghi chú

Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.

Hình ảnh



Deep Blue Improved



Lilac



Pink



White