

Hướng dẫn kĩ thuật

Hoa Salem – MS: FLIM000 – FLIM008: Qis

Thời gian cây con: 4 – 5 tuần

Ra hoa từ ngày sang chạu: 18 – 22 tuần

Mật độ gieo trồng: 10 – 20 cây/m²

Thích hợp trồng trong: luống

- Dòng hoa cắt cành chuyên nghiệp chất lượng cao
- Phát triển đồng đều
- Nở hoa ngọn 100%, nhánh cây khỏe và tán sung

Thông tin chung

Ánh nắng	Điều kiện gieo trồng	Chiều cao cây	Tán cây	Khoảng cách
Nắng	Hè	76 – 89 cm	20 – 25 cm	30 – 41 cm

Nảy mầm

Dạng hạt	Kích cỡ khay gieo (số lỗ)	Số hạt/lỗ	Thời gian cây con (tuần)	Ngày nảy mầm	Số đo pH/EC	Phủ hạt
Hạt thô	209	1	4 – 5	3 – 8	5.8 – 6.2 pH 0.75 mmhos/cm	Có

Giai đoạn cây con

	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Giai đoạn 3	Giai đoạn 4
Độ ẩm giá thể	Ướt	Ấm – ướt	Ấm – ướt	Ấm
Nhiệt độ	18 – 21°C	16 – 18°C	16 – 18°C	13 – 16°C
Ánh sáng		1,000 – 2,500 f.c.	1,000 – 2,500 f.c.	2,500 – 5,000 f.c.
Phân bón		<0.1g đạm/lít nước <0.7 EC	0.1 – 0.175g đạm/lít nước 0.7 – 1.2 EC	0.1 – 0.175g đạm/lít nước 0.7 – 1.2 EC

Những lưu ý trong giai đoạn cây con

Khi trồng trong điều kiện lạnh (10 – 13°C) 3 – 5 tuần sau khi nảy mầm, cây sẽ nở hoa nhanh & đều hơn.

Giai đoạn trồng

Nhiệt độ gieo trồng	pH/EC	Phân bón	Thời gian chiếu sáng
Trước khi ra hoa: (ngày) 13 – 16°C (đêm) 10 – 13°C	5.8 – 6.2 pH 1.5 – 2.0 mmhos/cm	0.175 – 0.225g đạm/lít nước 1.2 – 1.5 EC	Bắt buộc ngày dài

Thời gian ra hoa từ ngày sang chạu

Loại cây	Mùa vụ	Mật độ gieo trồng	Thời gian canh tác
-	Xuân	11 – 22 cây/m ²	18 – 22 (tuần)

Những lưu ý khi trồng

Dòng hoa lý tưởng để làm hoa cắt cành. Cuống hoa cứng cáp, không cần bao lưới.

Ghi chú

Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.

Hình ảnh



Apricot



Dark Blue



Lavender



Pale Blue



Pastel



Purple



Rose



White



Yellow



Mixture

WWW.FLORALSEL