

Hướng dẫn kĩ thuật

Hoàng anh cắt cành – MS: FMAT001 – FMAT013: Katz

Thời gian cây con: 4 tuần

Ra hoa từ ngày sang chậu: 8 – 13 tuần

Chiều cao thân: 80 cm

Mật độ gieo trồng: 126 cây/m²

Thích hợp trồng trong: luống

- Thời gian canh tác ngắn, chiều cao thân đồng đều, các màu ra hoa đồng loạt, chịu nhiệt tốt hơn các chủng loại khác
- Dòng Katz sẽ cho 50% hoa kép

Thông tin chung

Ánh nắng	Điều kiện gieo trồng	Chiều cao cây	Tán cây	Khoảng cách
Nắng	Xuân, Thu	81 cm	–	–

Nảy mầm

Dạng hạt	Kích cỡ khay gieo (số lỗ)	Số hạt/lỗ	Thời gian cây con (tuần)	Ngày nảy mầm	Số đo pH/EC	Phủ hạt
Hạt thô	209	1	4	3 – 4	5.8 – 6.2 pH 0.75 mmhos/cm	Có

Giai đoạn cây con

	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Giai đoạn 3	Giai đoạn 4
Độ ẩm giá thể	Uớt	Ấm – uớt	Ấm – uớt	Ấm
Nhiệt độ	20 – 22°C	16 – 18°C	16 – 18°C	13 – 16°C
Ánh sáng	Chiếu sáng	1,000 – 2,500 f.c. (10,800 – 26,900 Lux)	1,000 – 2,500 f.c. (10,800 – 26,900 Lux)	2,500 – 5,000 f.c. (26,900 – 53,800 Lux)
Phân bón		<0.1g đạm/lít nước <0.7 EC	0.1 – 0.175g đạm/lít nước 0.7 – 1.2 EC	0.1 – 0.175g đạm/lít nước 0.7 – 1.2 EC

Những lưu ý trong giai đoạn cây con

Không nên cố gắng chọn lọc cây con cho hoa kép. Phun thuốc diệt nấm để phòng ngừa bệnh đốm lá.

Giai đoạn trồng

Nhiệt độ gieo trồng	pH/EC	Phân bón	Thời gian chiếu sáng
Trước khi nở hoa: (ngày) 16 – 24°C (đêm) 7 – 13°C	5.8 – 6.5 pH 1.5 – 2.0 mmhos/cm	0.175 – 0.225g đạm/lít nước 1.2 – 1.5 EC	–

Thời gian ra hoa từ ngày sang chậu

Loại cây	Mùa vụ	Mật độ gieo trồng	Thời gian canh tác
–	Xuân	129 cây/m ²	7 – 11 (tuần)
–	Thu	129 cây/m ²	8 – 13 (tuần)

Những lưu ý khi bón phân

Bón phân 2 lần/tuần với hàm lượng 0.175 – 0.225g đậm/L nước, 1.2 – 1.5 EC. Dùng phân bón gốc ni-trát chứa hàm lượng lân thấp. Duy trì EC ở mức 1.5 – 2.0 và pH ở mức 5.8 – 6.5. Bón phân liên tục cho đến khi thu hoạch.

Những lưu ý khi trồng

Thời gian canh tác phụ thuộc vào cường độ & thời gian chiếu sáng. Nếu thời gian chiếu sáng >13 tiếng/ngày, thời gian canh tác sẽ rút ngắn còn 8 tuần. Ngày ngắn & ảnh hưởng của nhiệt độ sẽ gia tăng thời gian canh tác tối đa là 13 tuần. Không nên chọn lọc cây cho hoa kép ở giai đoạn lá mầm.

Các vấn đề thường gặp

Côn trùng: rệp vừng, bọ trĩ, sâu bướm

Bệnh: đốm lá, nấm Botrytis

Ghi chú

Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.

Hình ảnh



Apricot



Blue



Bright Rose



Cherry Blossom



Crimson



Lavender Blue



Light Lavender



Pink



Purple



Ruby



White



Yellow