

# Hướng dẫn kĩ thuật

## Mào gà cắt cành – MS: FCEL501 – FCEL510: Bombay

Thời gian cây con: 2 – 3 tuần

Ra hoa từ ngày sang chậu: 10 – 14 tuần

Mật độ gieo trồng: 64 – 80 cây/m<sup>2</sup>

Thích hợp trồng trong: nhà kính

- Dòng hoa cắt cành nhiều màu sắc, thích hợp cho sản xuất với mật độ cao & tiết kiệm chi phí
- Năng suất cao, cành khỏe và ít hoa đeo
- Hoa giữ màu tốt, thích hợp làm hoa khô

### Thông tin chung

| Ánh sáng | Điều kiện gieo trồng | Chiều cao cây | Tán cây | Khoảng cách |
|----------|----------------------|---------------|---------|-------------|
| Nắng vừa | Xuân, Hè             | 71 – 102 cm   | –       | –           |

### Nảy mầm

| Dạng hạt | Kích cỡ khay gieo (số lỗ) | Số hạt/lỗ | Thời gian cây con (tuần) | Ngày nảy mầm | Số đo pH/EC                   | Phủ hạt  |
|----------|---------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-------------------------------|----------|
| Hạt bọc  | 209                       | 1         | 2 – 3                    | 3 – 4        | 5.8 – 6.2 pH<br>0.75 mmhos/cm | Lớp mỏng |

### Giai đoạn cây con

|               | Giai đoạn 1                   | Giai đoạn 2                                 | Giai đoạn 3                                 | Giai đoạn 4                                 |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Độ ẩm giá thể | Ướt                           | Ướt                                         | Ám – ướt                                    | Ám – ướt                                    |
| Nhiệt độ      | 20 – 22°C                     | 20 – 22°C                                   | 20 – 22°C                                   | 20 – 22°C                                   |
| Ánh sáng      | Chiếu sáng                    | 1,000 – 2,500 f.c.<br>(10,800 – 26,900 Lux) | 1,000 – 2,500 f.c.<br>(10,800 – 26,900 Lux) | 2,500 – 5,000 f.c.<br>(26,900 – 53,800 Lux) |
| Phân bón      | <0.1g đạm/lít nước<br><0.7 EC | <0.1g đạm/lít nước<br><0.7 EC               | 0.1 – 0.175g đạm/lít nước<br>0.7 – 1.2 EC   | 0.1 – 0.175g đạm/lít nước<br>0.7 – 1.2 EC   |

### Những lưu ý trong giai đoạn cây con

Cây yêu cầu ngày ngắn, và sẽ được kích thích ra hoa dưới điều kiện ngày ngắn. Thời gian chiếu sáng để dòng Bombay đạt độ cao lý tưởng là khoảng từ 12 đến 13 tiếng. Rễ của cây mào gà là rễ cái, rất dễ bị tổn thương rễ, dẫn đến việc đóng nụ sớm, hình dáng hoa bất thường cũng như không đồng bộ. Vì thế, nhà vườn nên sang chậu trước khi rễ cây quấn vào bầu đất. Duy trì độ ẩm liên tục cho đất trồng, đặc biệt là 2 tuần đầu sa khi sang chậu để tránh tình trạng hoa nở quá sớm.

### Giai đoạn trồng

| Nhiệt độ gieo trồng                                                                   | pH/EC                         | Phân bón                                  | Thời gian chiếu sáng |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| (ngày) 16°C<br>(đêm) 15°C<br>Trước khi nở hoa:<br>(ngày) 18 – 24°C<br>(đêm) 17 – 18°C | 5.5 – 6.5 pH<br>0.75 mmhos/cm | 0.1 – 0.175g đạm/lít nước<br>0.7 – 1.2 EC | Ngày ngắn            |

### Những lưu ý trong giai đoạn trồng

Cây yêu cầu thời gian chiếu sáng từ 12 đến 13 tiếng/ngày để đạt chiều cao lý tưởng.

## Thời gian ra hoa từ ngày sang chậu

| Loại cây | Mùa vụ | Mật độ gieo trồng          | Thời gian canh tác |
|----------|--------|----------------------------|--------------------|
| -        | -      | 65 – 86 cây/m <sup>2</sup> | 10 – 14 (tuần)     |

### Những lưu ý khi bón phân

Cây dễ bị tổn thương do nồng độ muối & EC cao.

### Những lưu ý khi trồng

Nếu cần kiểm soát chiều cao, có thể phun daminozide 2,000ppm (2.5g/L công thức 85%, hoặc 3.0g/L công thức 64%). Bắt đầu phun khi cây đạt chiều cao từ 30 đến 50 cm, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Nên phun hàng tuần. Khi cây đạt chiều cao mong muốn, phun thêm 1 lần daminozide hàm lượng 3,250 ppm (3.8g/L công thức 85%, hoặc 5.0g/L công thức 64%) để khiến cây ngừng phát triển chiều cao.

### Các vấn đề thường gặp

**Côn trùng:** cực kì nhạy cảm với rệp vừng. Yêu cầu ngăn chặn hoàn toàn trước khi phát sinh bệnh. Phun thuốc diệt nấm ngay sau khi sang chậu. Các côn trùng khác: rệp, sâu đục lá

**Bệnh:** nấm Fusarium, nấm Botrytis. Nên phun thuốc diệt nấm ngay sau khi sang chậu.

### Ghi chú

Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.

### Hình ảnh



Cherry



Fiora



Fire



Green



Pink



Purple