

Hướng dẫn kĩ thuật



Xác pháo cắt cành – MS: FSAL001: Big Blue

Thời gian cây con: 4 tuần

Ra hoa từ ngày sang chậu: 8 – 13 tuần

Cái tên nói lên tất cả

Tên dòng xác pháo cắt cành Big Blue đã nói lên tất cả đặc điểm của chủng loại này – cây khỏe, cho hoa màu xanh rực rỡ. Dòng hoa này sẽ làm tất cả các chậu hoa thêm tươi tắn, và rất thích hợp cho trồng trang trí cảnh quan hoặc trồng trong vườn, và đương nhiên là để cắt cành.

- Chịu nhiệt và hạn tốt
- Cây ít cần chăm sóc
- Thu hút các sinh vật thụ phấn như chim ruồi, ong, bướm...
- Đẹp nhất khi sinh trưởng trong điều kiện nhiều nắng, nhưng vẫn phát triển tốt trong bóng râm

Thông tin chung

Ánh nắng	Điều kiện gieo trồng	Chiều cao cây	Tán cây	Khoảng cách
Nắng	Hè, Thu	61 – 91 cm	46 – 51 cm	41 – 46 cm

Nảy mầm

Dạng hạt	Kích cỡ khay gieo (số lỗ)	Số hạt/lỗ	Thời gian cây con (tuần)	Ngày nảy mầm	Số đo pH/EC	Phủ hạt
Hạt thô	209	1	3 – 4	4	5.5 – 5.8 pH 0.75 mmhos/cm	Tùy chọn
	112	1	4 – 5			

Giai đoạn cây con

	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Giai đoạn 3	Giai đoạn 4
Độ ẩm giá thể	Ướt	Ấm – ướt	Hơi ẩm – ướt	Hơi ẩm – ẩm
Nhiệt độ	20 – 25°C	20 – 25°C	20 – 22°C	17 – 18°C
Ánh sáng	Tùy chọn	1,500 – 2,500 f.c. (16,100 – 26,900 Lux)	3,000 f.c. (32,300 Lux)	3,000 f.c. (32,300 Lux)
Phân bón		<0.1g đậm/lít nước <0.7 EC	0.1 – 0.175g đậm/lít nước 0.7 – 1.2 EC	0.1 – 0.175g đậm/lít nước 0.7 – 1.2 EC

Chất điều hòa sinh trưởng

Daminozide/2,500 ppm/lần xịt

Những lưu ý trong giai đoạn cây con

Xác pháo phản ứng tốt với daminozide 2,500 ppm hoặc ancymidol 5 ppm hoặc paclobutrazol 5 ppm. Nên phun lần đầu 2 tuần sau khi gieo, và lặp lại 7 – 10 ngày sau đó nếu cần. Nếu trồng trong điều kiện ngày ngắn, bổ sung thêm thời gian chiếu sáng để cây mau ra hoa.

Giai đoạn trồng

Nhiệt độ gieo trồng	pH/EC	Phân bón	Thời gian chiếu sáng
(ngày) 20 – 26°C (đêm) 18 – 20°C	5.8 – 6.2 pH 1.2 – 1.5 mmhos/cm	0.175 – 0.225g đậm/lít nước 1.2 – 1.5 EC	Yêu cầu ngày dài

Thời gian ra hoa từ ngày sang chậu

Kích cỡ chậu	Số cây/chậu	Thời gian ra hoa	Mùa vụ	Chất điều hòa sinh trưởng
12 – 15 cm	1	13 – 14 (tuần)	Cuối xuân	Daminozide 2,500 ppm
12 – 15 cm	1	12 – 13 (tuần)	Mùa hè	Daminozide 2,500 ppm

Những lưu ý khi trồng

Ngắt đợt 14 – 21 ngày sau khi sang chậu, chừa lại 4 đốt. Nếu muốn thúc hoa để sử dụng trang trí cảnh quan, có thể sử dụng chậu nhỏ. Có thể thay thế daminozide bằng paclobutrazol 3 – 5 ppm.

Ghi chú

Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.

Hình ảnh



Big Blue



Big Blue



Big Blue



Big Blue



Big Blue



Big Blue