



HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Dừa cạn rũ – MS: FVIN001 – FVIN018: Mediterranean

Thời gian cây con: 4-5 tuần

Ra hoa từ ngày sang chậu (chậu treo): Mùa xuân: 12-14 tuần, Mùa hè: 8-10 tuần

- Trồng vào chậu treo.
- Thời gian phủ chậu nhanh, độ rũ của tán cây rất xuất sắc.
- Không có sự chênh lệch về thời gian ra hoa của các màu, hoa to, tỉ lệ nảy mầm cao.

Thông tin chung

Ánh sáng	Điều kiện gieo trồng	Chiều cao cây	Độ rũ	Khoảng cách
Nắng nhiều	Quanh năm	4-6 in. (10-15 cm)	20-30 in. (51-76 cm)	8 in. (20 cm)

Nảy mầm

Dạng hạt	Khay gieo Kích cỡ (số lỗ)	Số hạt/lỗ	Thời gian cây con (tuần)	Ngày nảy mầm	Số đo pH/EC	Phủ hạt
Thô	209	1	5	3-5	5.8-6.0 pH 0.75 mmhos/cm	Có

Giai đoạn cây con

	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Giai đoạn 3	Giai đoạn 4
Độ ẩm giá thể	Ướt	Ẩm-ướt	Hơi ẩm-ướt	Hơi ẩm-ướt
Nhiệt độ	75-78°F (24-26°C)	70-72°F (21-22°C)	70-72°F (21-22°C)	70-72°F (21-22°C)
Ánh sáng	Không bắt buộc	2,500 f.c. (26,900 Lux)	2,500 f.c. (26,900 Lux)	5,000 f.c. (53,800 Lux)
Phân bón	<0.1g đậm/lít nước; <0.7 EC	0.1g đậm/lít nước; <0.7 EC	0.1g-0.175g đậm/lít nước; 0.7-1.2 EC	0.1g-0.175g đậm/lít nước; 0.7-1.2 EC

- Không cần nhiều nước.

Những lưu ý trong giai đoạn cây con

Thời tiết ẩm và nắng nhiều trong quá trình canh tác sẽ giúp tăng chất lượng sản phẩm và rút ngắn thời gian canh tác.

Giai đoạn trồng

Sang chậu Nhiệt độ	Số đo pH/EC	Phân bón	Thời gian chiếu sáng
(ngày) 75°F (24°C) (đêm) 65-68°F (18-20°C)	5.5- 6.0 pH 1.5- 2.0 mmhos/cm	0.225g-0.3g đậm/lít nước; 1.5-2.0 EC	Không ảnh hưởng bởi thời gian chiếu sáng

Thời gian ra hoa từ ngày sang chậu

Kích cỡ chậu	Số cây/chậu	Thời gian	Mùa vụ	Điều hòa sinh trưởng
15 cm	1	8-9 (tuần)	Mùa xuân	daminozide 2,500ppm phun
25-30 cm	7	12-14 (tuần)	Mùa xuân	daminozide 2,500ppm phun
15 cm	1	5-6 (tuần)	Mùa hè	daminozide 2,500ppm phun
25-30 cm	7	8-10 (tuần)	Mùa hè	daminozide 2,500 ppm phun

Những lưu ý khi sử dụng phân bón

Bắt đầu tuần thứ 1 sau khi sang chậu, dùng phân bón với hàm lượng 0.225g-0.3g đậm/ lít nước; 1.5-2.0 EC. Dùng phân bón có gốc nitrate với thành phần lân thấp và kali cao. Duy trì EC từ 1.5-2.0 và pH 5.8 đối với giá thể.

Chất điều hòa sinh trưởng.

Sử dụng phương pháp ngắt đọt để tán cây rũ, cho nhánh nhiều nếu không sử dụng chất điều hòa sinh trưởng.

Khuyến cáo

Côn trùng: Nhện đỏ, bọ trĩ, rệp, rệp sáp. Các loại bệnh về nấm, bệnh mốc xám, bệnh phytophthora, virus.

Những lưu ý khi trồng

Phun thuốc diệt nấm khi sang chậu. Cung cấp đủ ánh sáng để trong quá trình canh tác để sản phẩm đạt chất lượng. Duy trì độ ẩm giá thể vừa phải, tránh dư nước trong giá thể và tán lá bị ẩm ướt, vì đây là điều kiện thuận lợi để phát sinh dịch bệnh. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm càng ít sẽ kiểm soát được chiều cao cây. Sử dụng thêm chất điều hòa sinh trưởng nếu cần thiết.

Ghi chú: Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.

Hình ảnh



Burgundy Halo



Dark Red



Hot Rose



Peach



Red



Rose Halo



Strawberry



White



Lipstick Mixture



Mixture